

市内委託医療機関と受けられる予防接種(ワクチン接種)一覧

医療機関名	住所 電話番号	三種混合	二種混合	麻しん・ 風しん (MR)	日本 脳炎	BCG	子宮頸がん 予防ワクチン	ヒブ ワクチン	小児用 肺炎球菌 ワクチン
		ジフテリア・ 百日せき・ 破傷風(DPT) 1期	ジフテリア・ 破傷風(DT) 2期						
大竹中央クリニック	新町1丁目1番25号 ☎②6200	○	○	○	—	—	○	○	○
しまだファミリークリニック	油見3丁目12番7号 ☎③3022	○	○	○	○	○	○	○	○
レディースクリニックとよしま医院	油見3丁目19番6号 ☎③7789	○	○	○	○	○	○	○	○
荒田クリニック	油見3丁目19番19号 ☎③4100	○	○	○	○	○	○	○	○
坪井クリニック	本町1丁目1番18号 ☎②8337	—	○	○	○	—	○	—	—
シルククリニック	本町1丁目5番6号 ☎②3313	○	○	○	○	○	○	○	○
大和橋医院	本町2丁目9番4号 ☎②3059	—	○	○	○	—	○	—	—
本町医院	本町2丁目15番17号 ☎②4427	—	○	○	○	—	—	—	—
松前内科医院	西栄1丁目8番13号 ☎②2815	○	○	○	○	—	○	○	○
渡辺医院	立戸2丁目3番8号 ☎③1151	○	○	○	—	○	○	○	○
こうろ皮ふ科	立戸2丁目6番26号 ☎②1112	—	—	—	—	—	○	—	—
松浦医院	小方1丁目21番30号 ☎②7053	○	○	○	—	—	—	—	—
佐川内科医院	玖波2丁目4番2号 ☎②2233	○	○	○	○	○	○	○	○
広島西医療センター	玖波4丁目1番1号 ☎②7151	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 医療機関により、接種が可能な日や時間帯が異なります。確認の上、受診してください。また、ワクチンの確保が必要となりますので、事前に医療機関に連絡しておいてください。市外の医療機関で接種を希望される方は、接種する前に保健介護課へ連絡し、受託の有無を確認してください。

**ポリオ生ワクチンの投与(前期)**

ポリオ(急性灰白髄炎)は「小児まひ」とも呼ばれ、ポリオウイルスに感染することで、手足にまひを起こす病気です。わが国では、昭和55年以降自然感染による患者は出ていませんが、世界的にみると依然として感染が多くみられます。免疫がないと、海外渡航や国内で再び患者が発生した時に、感染する可能性があります。忘れずに投与を受けましょう。

また、国は平成24年度末までに不活化ワクチンを導入するよう検討していますが、現段階では、開始時期や対象などは未定です。

**受付時間**  
12時30分～13時10分

**総合市民会館**

**対象**  
生後3か月から90か月(7歳6か月)までの、ポリオ生ワクチンの投与が2回済んでいない乳幼児など(標準は生後3か月に達した時から18か月に達するまでの期間)

**ポリオ予防接種(前期)日程と対象地区**

とき	対象地区	
5月 9日(水)	大竹地区	東栄、西栄、南栄、北栄
	小方地区	御幸町、立戸、安条、前飯谷、後飯谷、穂仁原、比作、防鹿
5月10日(木)	大竹地区	新町、油見、本町、木野、白石、元町
	小方地区	三ツ石町、湯舟町、晴海、港町、阿多田
5月11日(金)	小方地区	御園、御園台、小方、黒川
	玖波・栗谷地区	玖波、玖波町、松ヶ原町、栗谷町

※ なるべく指定された日に来てください。都合が合わない場合は、別の日でも構いません。

**必要なもの**  
予診票、母子健康手帳

※ 保護者が同伴できない場合は、「同意書」が必要な場合があります。事前に連絡してください。また、服薬している方は、事前に主治医と相談してください。

問い合わせ 保健介護課 ☎2140

# 子どもの予防接種と 子宮頸がんなどのワクチン接種



問い合わせ 保健介護課 ☎2140

予防接種は、感染予防、発病防止、症状の軽減、病気のまん延防止などを目的としています。年齢や回数・間隔に注意して、子どもの体調を十分確認した上で接種を受けるようにしましょう。

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種の公費助成は1年延長され、平成25年3月末までとなりました。接種を希望する方は、対象年齢になったら、早めに接種を開始しましょう。

**接種期間**  
4月2日(月)～平成25年3月30日(土)

**接種場所**  
市が委託している医療機関で個別に接種(ポリオを除く)が必要なもの

予診票、予防接種券、母子健康手帳

※ 予診票と予防接種券を持ってない方は、母子健康手帳を持参の上、保健介護課で交付申請を行ってください。

**個人通知**  
三種混合2期、麻しん風しん(2期・3期・4期)、子宮頸がん予防ワクチン接種(中学1年女子)は、4月中に通知をします。

予防接種(ワクチン接種)の種類と接種の標準的な時期

種類	接種時期	2	3	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		カ	カ	カ	カ	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳
定期	ポリオ	41日(6週間)以上の間隔をおいて2回投与を行います。																							
	ジフテリア百日せき破傷風(三種混合)	20～56日まで(3～8週間)の間隔をおいて初回接種(3回)を行い、1回初回接種(3回)終了後12月に達した時から18月に達するまでの期間に1期追加を接種します。																							
予防	麻しん(はしか)風しん	1期 2期 3期 4期 幼稚園、保育所などの年長児 中学1年生に相当する年齢の方 高校3年生に相当する年齢の方																							
	日本脳炎	6～28日まで(1～4週間)の間隔をおいて1期初回接種(2回)を行い、1期初回接種終了後から概ね1年おいて1期追加接種を行います。 特例対象者:平成7年6月1日～平成19年4月1日生まれ 第1期(初回・追加)及び2期の未接種分が接種できます。																							
任意	BCG																								
	子宮頸がん予防ワクチン	※ 中学1年生から高校1年生に相当する年齢の女子 ※ 平成23年度中に接種を開始している(1回以上接種)高校2年生は、対象となります。																							
	ヒブワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン																								

※ 上の表の■および□は、予防接種法で定められた定期の予防接種の対象者です。病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間(標準的な接種期間)である■の期間中にできるだけ接種を受けましょう。  
麻しん(はしか)風しんの3期・4期は、平成20年度から5年間の措置です。2期の対象となる子どもは該当しません。  
任意予防接種は、予防接種法に規定されていないため、接種義務はありません。希望する場合にのみ、接種をしてください。