

## こどもの定期予防接種（A類疾病）の接種時期一覧

ワクチン		種類	対象年齢	接種回数と望ましい接種期間	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小学校就学前年度	7歳	8歳	9歳	11歳	小学校6年生	12歳	13歳	14歳	高校1年生相当	20歳未満	
ロタウイルス	①ロタリックス (2回接種)	経口生	生後6週0日～24週0日後	①=計2回 ②=計3回 初回を生後2か月～出生14週6日後の間に接種	1	2																									
	②ロタテック (3回接種)		生後6週0日～32週0日後	①②どちらのワクチンにするか主治医と相談してください。	1	2	3																								
B型肝炎		不活化	1歳の誕生日の前日まで	計3回 生後2か月～8か月	1	2																									
小児用肺炎球菌 ※1		不活化	生後2か月～5歳の誕生日の前日	計4回 開始年齢などにより接種回数異なります。 初回3回：1回目を生後2か月から6か月追加1回：1歳～1歳2か月（初回終了後60日以上空ける。）	1	2	3																								
五種混合 (DPT-IPV-Hib) ジフテリア(D) 百日せき(P) 破傷風(T) ポリオ(IPV) Hib感染症		不活化	生後2か月～7歳6か月になる前日	計4回 初回3回：1回目を生後2か月から6か月追加1回：初回接種を終了して6か月～18か月までの間隔を置く。	1	2	3																								
BCG		注射生	1歳の誕生日の前日まで	1回 生後5か月～7か月				1																							
麻しん風しん混合 (MR)		注射生	1期：1歳～2歳の誕生日の前日 2期：年長児（小学校就学前の3月31日まで）	計2回 1期1回：1歳になったらすぐ 2期1回：年長になったらできるだけ早く											1																
水痘 (水ぼうそう)		注射生	1歳～3歳の誕生日の前日まで	計2回 1回目：1歳～1歳2か月 2回目：1回目の接種を終了して6か月～12か月年長になったらできるだけ早く											1	2															
日本脳炎		不活化	1期：生後6か月～7歳6か月になる前日 2期：9歳～13歳の誕生日の前日	計4回 1期初回2回：3歳 1期追加1回：4歳（初回終了後おおむね1年後） 2期1回：9歳																											
			特例 平成17.4.2～平成19.4.1生まれの20歳未満	特例接種に該当する人は、過去の接種歴と併せて合計4回まで接種可能																											
二種混合 (DT) ジフテリア(D) 破傷風(T)		不活化	11歳～13歳の誕生日の前日まで	1回 11歳																											
子宮頸がん予防(HPV) シカド (9価) 対象者：女子		不活化	小学6年生～高校1年生相当の女子	計3回 ※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は2回で完了																											

- ・接種間隔の起算日は接種した日の翌日です。接種間隔は法令では日数は定められていますが、たとえば「1週間の間隔」というのは「1週間後の同じ曜日の日以降」と考えてください。
- ・初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として接種します。
- ・日本脳炎2期、二種混合および子宮頸がんワクチンの予診票及び接種券は、対象時期に改めて送付します。

